6. Studienjahr Medizin: Kurs Prävention in der Arztpraxis

Adipositasprävention in der Arztpraxis

David Fäh

Inhalt

- Adipositas Schweiz: Häufigkeit & Trends
- Gewichtskontrolle in der Arztpraxis
- Ernährung
- Essverhalten
- Bewegung
- Bariatrische Chirurgie

Übergewicht und Adipositas, 1992–2012

G 5

Quelle: SGB

© Bundesamt für Statistik (BFS)

Erwachsene Schweiz, MenuCH, 2015

Figure 7 Relative frequency (%) of body mass index categories (measured data) overall, by sex and age groups.

<https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/mensch-gesundheit/koerpergewicht-bewegung/koerpergewicht.html>; <https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/menuch/menu-ch-ergebnisse-ernaehrung.html>

David Fäh, 17.09.2018: Adipositasprävention in der Arztpraxis

Institut für Epidemiologie,
Biostatistik und Prävention

Universität
Zürich UZH

BMI Stellungspflichtige Schweiz

Der Body-Mass-Index der Schweizer Stellungspflichtigen
2015. Bericht zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit

David Fäh, 17.09.2018: Adipositasprävention in der Arztpraxis

Institut für Epidemiologie,
Biostatistik und Prävention

Universität
Zürich ^{UZH}

Schulkinder Schweiz, 2010-17

● Adipositas ● Übergewicht (inkl. Adipositas)

http://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/1_de/d-ueber-uns/5-downloads/Faktenblatt_013_GFCH_2016-03_-_BMI-Monitoring.pdf

Institut für Epidemiologie,
Biostatistik und Prävention

Universität
Zürich ^{UZH}

Figure 4: Prevalence of changes in weight status categories from kindergarten to grade 8 (n = 3542).

Body Mass Index, Risiko, Schweiz

MONICA: Multinational
MONItoring of trends and
determinants in
CARDiovascular disease,
Schweiz, 1983-1992

Männer und Frauen, Gesamtsterblichkeit

Inhalt

- Adipositas Schweiz: Häufigkeit & Trends
- **Gewichtskontrolle in der Arztpraxis**
- Ernährung
- Essverhalten
- Bewegung
- Bariatrische Chirurgie

	Bereich		
	Grün	Gelb/Orange	Rosa/Rot
Body-Mass-Index ^a (kg/m ²)	<25	25-29.9	≥30
Bauch(Tailen)umfang ^b (cm, Männer/Frauen)	<94/80	94-101/80-87	≥102/88
Taille-zu-Hüft-Verhältnis (Waist-Hip-Ratio, WHR, Männer/Frauen)	<0.9/0.8	0.9-1/0.8-0.9	≥1/0.9
Körpergrösse-zu-Taille-Verhältnis (Waist-to-Height-Ratio, WHtR) ^c	<0.4	0.5-0.6	≥0.6
Körperfett (%, Männer/Frauen) ^d	<20/30	20-24/30-34	≥25/35

^aKörpergewicht (in Kilo) / Körpergrösse (in Meter) / Körpergrösse (in Meter)]

^bHorizontal gemessen auf Bauchnabelhöhe

^cBauchumfang sollte max. die Hälfte der Körpergrösse betragen (<87cm bei 175cm)

^dGilt für Menschen mittleren Alters. Ab Alter 65 liegen die Grenzwerte jeweils 5% höher

Institut für Epidemiologie,
Biostatistik und Prävention

Universität
Zürich ^{UZH}

Wie gross ist die Motivation?

BMI	< 18.5 Untergewicht	25 - 29.9 Übergewicht	30 - 34.9 Adipositas I	35 - 39.9 Adipositas II	≥40 Adipositas III
Gesundheits-Risiko	keines bis hoch	gering	moderat	erhöht	hoch
Ernährung	X	X	X	X	X
Körperliche Aktivität	X*	X	X	X	X
Essverhalten	X	X	X	X	X
Medikamente		(X)	X	X	X
Bariatrische Chirurgie		-	-	X	X

* je nach Ursache

Gewichtsreduktion (konservativ)

- Etwa 5-10% Gewichtsverlust anpeilen
- Ca. 2 Kilo Gewichtsverlust pro Monat
- Ziele und Gewichtsreduktion etappieren
- Max. 1-2 Verhaltens-Veränderungen gleichzeitig
- Veränderungen müssen zum individuellen Lebensstil passen und nachhaltig sein
- Gesundheit muss im Vordergrund stehen

Inhalt

- Adipositas Schweiz: Häufigkeit & Trends
- Gewichtskontrolle in der Arztpraxis
- **Ernährung**
- Essverhalten
- Bewegung
- Bariatrische Chirurgie

Mediterrane Ernährungsweise

<p>ungesüsste Getränke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wasser - Tee - Kaffee			<p>Früchte Gemüse Salat Hülsenfrüchte Nüsse Samen Kräuter Getreideprodukte (wenn immer möglich Vollkorn)</p> <p>Olivenöl, Rapsöl</p>	<p>täglich</p> <p>Für die tägliche Zubereitung</p>
<p>Alkohol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moderaten Konsum tolerieren - für die, die es mögen - auf Kalorienzufuhr achten			<p>Fisch, Meeresfrüchte Geflügel Eier Tofu Milchprodukte (ungesüsst)</p>	<p>moderat; als Hauptmahlzeit nicht täglich nötig</p>
		<p>Rotes Fleisch und Fleischprodukte, Süßes, Süssgetränke, Knabberien, raffinierte Stärkeprodukte (z.B. Weissmehl), Frittiertes, Paniertes</p>	<p>sparsam; maximal 2 Mal pro Woche</p>

Gesundheitseffekte der Mediterranen Ernährung	Ausmass
Risiko-Reduktion für Mortalität durch koronare Herzkrankheit	20-40%
Risiko-Reduktion für Krebs-Mortalität	20-30%
Risiko-Reduktion für Gesamt-Mortalität	17-25%
Risiko-Reduktion für kardiovaskulären Erkrankungen	25-45%
Risiko-Reduktion für Diabetes Typ 2 (Inzidenz)	25-30%
Abnahme von Körpergewicht, BMI, Bauchumfang	Im Schnitt 5 Kilo nachhaltiger Gewichtsverlust
Verbesserung bei Komponenten des metabolischen Syndroms	variabel, um 30-40%

Curr. Cardiovasc. Risk Rep. **8**, 416 (2014)

atavola

David Fäh, 17.09.2018: Adipositasprävention in der Arztpraxis

Institut für Epidemiologie,
Biostatistik und Prävention

**Universität
Zürich** UZH

Veränderungen im Konsum und Gewichtsveränderung über 4 Jahre

<http://circ.ahajournals.org/content/133/2/187>

Veränderungen im Konsum (pro Portion) und Gewichtsveränderung (in kg) über 4 Jahre

Esstagebuch

Auswertungs- und Interpretationshilfe für den Arzt

Fragen/Kriterien	Ja	Nein
1. Isst er/sie regelmässig, stets ungefähr zur gleichen Zeit?	☐	☐
2. Nimmt er/sie ausgewogene, komplette Hauptmahlzeiten zu sich?	☐	☐
3. Ist der Gemüse-Anteil gross genug (ca. 30-50% des Tellers)?	☐	☐
4. Dauert seine/ihre Mahlzeit lange genug (ca. 20 Minuten)?	☐	☐
5. Nascht er/sie oft zwischen den Mahlzeiten? Falls ja: warum?	☐	☐
6. Isst er/sie vielseitig (nicht jeden Tag dasselbe)?	☐	☐
7. Gibt's ein regelmässiges Frühstück?	☐	☐
8. Isst er/sie nach dem Abendessen?	☐	☐
9. Kommt er/sie auf 3-5 Portionen Früchte und Gemüse?	☐	☐
10. Löscht er/sie den Durst überwiegend kalorienfrei?	☐	☐
11. Fühlte er/sie sich nach dem Essen satt und zufrieden?	☐	☐
12. Bringt ihn/sie Stress, Frust oder Langeweile zum essen?	☐	☐
13. Isst er/sie an Orten, die dafür nicht vorgesehen sind?	☐	☐
14. Isst er/sie stets sitzend, mit Messer und Gabel?	☐	☐
15. Plagt ihn/sie auch mal schlechtes Gewissen nach dem Essen?	☐	☐
16. Kommt es vor, dass er/sie sich überisst?	☐	☐
17. Gibt es Momente, wo er/sie die Kontrolle darüber verliert, was und wie viel er/sie isst?	☐	☐
18. Isst er/sie am Wochenende mehr und ungesünder als unter der Woche?	☐	☐
19. Sieht das ausgefüllte Esstagebuch mehrmals zusammengefaltet und gebraucht aus?	☐	☐
20. Wurden unterschiedliche Schreibutensilien zum Ausfüllen verwendet (unterschiedliche Tinten, Farbtöne, Dicken)?	☐	☐
21. Unterscheidet sich der Schreibstil zwischen den unterschiedlichen Einträgen (z.B. in der Leserlichkeit oder der Ausrichtung: gerade/kursiv, horizontal/schräg)?	☐	☐

1 – Selbst-Check: Da erkenne ich mich wieder ...

WAS esse ich?

So viele Portionen Gemüse und Früchte esse ich pro Tag (eine Portion = eine Hand voll):	4-5	2-3	weniger
So oft esse ich Fleisch und Fleischprodukte (z. B. Wurst, Rind- oder Schweinefleisch) pro Woche:	bis 2x	3-4x	häufiger
Ich trinke kalorienhaltige Getränke (z. B. Cola, Eistee, Fruchtsaft, Alkoholisches)	regelmässig	manchmal	selten /nie
Ich nasche Süsses, Fettiges, Salziges zwischendurch	regelmässig	manchmal	selten /nie
Ich esse stark verarbeitete Fertigprodukte (z.B. Pizza, Lasagne, Burger, Pommes, Paniertes)	regelmässig	manchmal	selten /nie

WIE esse ich?

Ich esse regelmässig (Zmorge, Zmittag, Znacht)	selten	meistens	fast immer
Ich nasche zwischendurch	selten	manchmal	oft
Ich esse aus Stress, Frust, Langeweile	selten	manchmal	oft
Mich plagt ein schlechtes Gewissen nach den Essen	selten	manchmal	oft
Ich überesse mich schnell einmal	selten	manchmal	oft
Ich meine, dass ich meinen Teller leer essen muss	selten	manchmal	oft
Ich esse sehr schnell	selten	manchmal	oft

Inhalt

- Adipositas Schweiz: Häufigkeit & Trends
- Gewichtskontrolle in der Arztpraxis
- Ernährung
- **Essverhalten**
- Bewegung
- Bariatrische Chirurgie

Essverhalten

- Strukturiert: regelmässige Hauptmahlzeiten
- Sattmachende Mahlzeiten
- Snacking (Naschen) und evtl. Heisshungerattacken erkennen und angehen
- Essgeschwindigkeit reduzieren, bewusst essen
- Verbindung zwischen Essen und Emotionen (Stress, Langeweile, Trauer, Einsamkeit, etc.) kappen und Ersatzhandlungen finden

Essstörungen

Problematisches Essverhalten

	Trifft (eher) zu	Trifft (eher) nicht zu
1. Ich war mit meiner Figur schon so unglücklich, dass ich weinen musste	☐	☐
2. Wegen meiner Figur habe ich zuhause schon Spiegel entfernt oder verdeckt	☐	☐
3. Ich habe schon Abführmittel, Appetitzügler, wassertreibende Mittel (Diuretika) oder Hormone eingenommen um mich schlanker zu fühlen oder um abzunehmen	☐	☐
4. Spät abends oder in der Nacht habe ich manchmal unbändiges Verlangen nach Essen oder Trinken	☐	☐
5. Wenn es sein muss, kann ich einen ganzen Tag lang fasten	☐	☐
6. Es kommt vor, dass ich heimlich esse	☐	☐
7. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einen zu dicken Menschen, unabhängig von meinem Gewicht	☐	☐
8. Ich würde für eine gute Figur fast alles tun	☐	☐
9. Wenn Andere dabei sind, kann ich mich zusammenreissen und normal essen	☐	☐
10. Ab und zu kommt es vor, dass ich nonstop esse, bis es mir schlecht wird	☐	☐
11. Ich verliere manchmal die Kontrolle darüber, was und wie viel ich esse	☐	☐
12. Ich habe panische Angst davor, dick(er) zu werden	☐	☐
13. Es gibt Momente, da fühle ich mich vom Drang "ferngesteuert", schnell viel essen zu müssen	☐	☐
14. Es kommt vor, dass ich wahllos und wild durcheinander esse	☐	☐
15. Ich schäme mich manchmal wegen meines Essverhaltens	☐	☐
16. Ich habe schon mehrere strenge Diäten durchgeführt	☐	☐
17. Es kommt mir manchmal vor, als würde sich in meinem Leben alles nur ums Essen drehen	☐	☐
18. Ich fühle mich sehr schuldig dafür, dass ich so esse, wie ich esse	☐	☐
19. Ich habe schon erbrochen, um die Kalorien wieder los zu werden	☐	☐
20. Ich würde fast alles tun, um in gewissen Momenten essen zu können	☐	☐
21. Ich finde, dass mein Essverhalten abnormal ist	☐	☐
22. Es gibt Auslöser, die meinen Drang zum Essen zum Explodieren bringen	☐	☐
23. Mein Gewicht schwankt um mehr als 2 Kilo in einer Woche	☐	☐
24. Manchmal würde ich am liebsten im Boden versinken, wenn mich andere anschauen	☐	☐
25. Es gibt Tage, an denen ich keine richtigen Mahlzeiten (am Tisch mit Besteck) esse	☐	☐
Total		

Inhalt

- Adipositas Schweiz: Häufigkeit & Trends
- Gewichtskontrolle in der Arztpraxis
- Ernährung
- Essverhalten
- **Bewegung**
- Bariatrische Chirurgie

Bewegung

- PAPERICA*: Bewegungsförderung
- Bei den Zielen bescheiden bleiben
- In den Alltag integrieren
- Individuelle Möglichkeiten berücksichtigen
- Bewegung muss auch Spass machen
- Alleine oder in Gemeinschaft?
- Zeitfenster freischaufeln

*Physical Activity PRomotion In Primary Care, www.paprica.ch

Institut für Epidemiologie,
Biostatistik und Prävention

Universität
Zürich ^{UZH}

SCHWEIZERISCHE
ADIPOSITAS-STIFTUNG SAPS

Bewegen! – Aber wie?

Ein Bewegungs-Brevier für
übergewichtige Menschen.

Jede Bewegung ist besser als keine.

Schweizerische Adipositasstiftung SAPS; www.saps.ch

David Fäh, 17.09.2018: Adipositasprävention in der Arztpraxis

Institut für Epidemiologie,
Biostatistik und Prävention

**Universität
Zürich** UZH

Inhalt

- Adipositas Schweiz: Häufigkeit & Trends
- Gewichtskontrolle in der Arztpraxis
- Ernährung
- Essverhalten
- Bewegung
- **Bariatrische Chirurgie**

Bariatrische Chirurgie

- Interdisziplinäre Betreuung
- Präoperative Abklärung
- Nachsorge (Nährstoff-Supplementierung, plastische Chirurgie)
- Evtl. Behandlung von Begleiterkrankungen (orthopädische, psychische, Schlafapnoe, Diabetes, Dyslipidämie, Hypertonie, etc.)

Voraussetzungen Chirurgie (seit 2011)

- BMI >35 kg/m²
- Erfolglose adäquate Therapie $\geq 1^*-2$ Jahre
- Keine Altersbeschränkung mehr aber
- Einschränkungen bei <18 und >65 Jahren
- Unterscheidung: Primär- und Referenzzentren
- Kein Komorbiditäts-Nachweis mehr nötig
- *Bei BMI ≥ 50 kg/m² ist nur ein Jahr nötig

www.smob.ch

www.saps.ch

www.sge-ssn.ch

www.iotf.org

<http://www.who.int/topics/obesity/en/>

www.nationalobesityforum.org.uk

www.domuk.org

www.aso.org.uk

www.nice.org.uk